

นายสุตฟี เจะเตะ ชื้อเล่น บังรอน



Young smartfarmer และเกษตรกรสวนทุเรียนแปลงใหญ่ ต.กรงปินัง มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรคไฟทอปเทอร่า ทั้งการป้องกันและรักษา ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์อาการเบื้องต้นของโรคตลอดจนรักษาต้น ให้หายกลับมาสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นแปลงต้นแบบและตัวอย่างให้กับสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพกรงปินัง

A man in a black t-shirt and black pants is standing in a field, holding a large, spiky durian fruit. He is looking down at the fruit. The background is a lush green field with trees in the distance.

นายสุตฟี เจะเตะ (ชื่อเล่นบั้งรอน)

YOUNG SMARTFARMER และเกษตรกรสวนทุเรียนแปลงใหญ่ ต.กรงปินัง มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรคไฟทอปเทอร่า ทั้งการป้องกันและรักษา ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์อาการเบื้องต้นของโรคตลอดจนรักษาต้นให้หายกลับมาสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นแปลงต้นแบบและตัวอย่างให้กับสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพกรงปินัง

การจัดการไฟทอปธอรา (PHYTOPHTHORA) ฉบับ บังรอน



- ➔ ปรับสภาพดิน
- ➔ ฟันอิฐมีกอะมิโนทางดิน
- ➔ ฝังเข็มด้วยกรดฟอสโฟนิก
- ➔ ขุดและทาแผลด้วยฟอสอีทิลอะลูมิเนียม
- ➔ เมื่อแตกยอดอ่อน ฟันยาฆ่าแมลง
- ➔ แผลแห้ง ใบสมบูรณ์ ใส่ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ตามปกติ





เบื้องต้นในการแก้ปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่า อันดับแรกเลยแก้ที่ดินและระบบรากก่อน ควรให้ดินมีค่าเป็นกลาง โดยวัดจากเครื่องวัดPHดินที่มีประสิทธิภาพ หรือเอาดินไปตรวจ จากนั้นปรับสภาพดินให้เป็นกลางโดยการหว่านโดโลไมท์หรือยิปซัม พร้อมกระตุ้นรากฝอยโดยการพ่นชีวมิคอะมิโนทางดินผสมยาฆ่าเชื้อรา (ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม) และฝังเข็มด้วยกรดฟอสโฟนิกผสมน้ำกลั่น 1:1 และขุดทาแผลด้วยฟอสอีทิลอะลูมิเนียม+ปูนแดงและผสมยาฆ่ามอดบวกลสารเร่งซึม เพื่อฆ่าเชื้อไฟทอปและตัวมอด ส่วนจำนวนเข็มที่ฝังต่อต้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดลำต้นและใบของต้นทุเรียน



เมื่อทุเรียนแทงยอดใหม่ก็พ่นยาแมลงเก็บใบให้อยู่ เพื่อที่ใบจะได้สังเคราะห์แสงและบำรุงต้นทุเรียนให้แข็งแรง เมื่อต้นทุเรียนหายจากการโรคไฟทอปแล้ว ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินและฉีดพ่นทางใบผสมธาตุรองเสริมหรือฮอร์โมนไปด้วย ส่วนการใช้สารชีวภัณฑ์จำพวกไตรโคเดอร์มาในการรักษาโรคไฟทอปนี้ แนะนำใช้ใบเชิงป้องกันจะดีกว่าเป็นแล้วค่อยรักษา โดยเชื้อไตรโคเดอร์มาจะได้รับการสนับสนุนและให้ความรู้จากเกษตรอำเภอได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น วิธีการทำจากหัวเชื้อที่มีประสิทธิภาพ สภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อไตรโคเดอร์มา เป็นต้น



แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของสวนควรหมั่นสังเกตอาการต้นทุเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ รวมทั้งขอคำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและสารเคมีเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดและปลอดภัยกับทางหน่วยงานเกษตรอำเภอในพื้นที่